

Autour du sevrage

Avec l'étape du sevrage, le veau est devenu pleinement ruminant : son rumen s'est suffisamment développé pour prendre le relais suite à toute la 1^{ère} phase d'alimentation lactée ; il est **capable de satisfaire ses besoins uniquement avec des aliments solides**.

Objectif



Sevrer le veau " le plus tôt possible ", pour obtenir ensuite une taille et un poids suffisants à l'IA, et un vêlage précoce. L'âge optimal du sevrage est à 8-10 semaines (pour un poids de 90-100 kg) ; mais il tient surtout compte de la **quantité de concentré consommée = minimum 2 kg**

Moyens

Pour initier le développement du rumen, **distribuer un concentré équilibré et appétent** le plus tôt possible (dès 8 jours d'âge), ainsi que **des fibres** (foin « peu riche », paille) ; bien sûr avec **de l'eau** de qualité, indispensable au développement de la flore du rumen.

**LE CONCENTRE DOIT REpondre
AUX CRITERES SUIVANTS
(JUSQU'A 3 MOIS D'AGE) :**



- **0.95 UF (0.9-1 UFL)**
- **110-120 g PDI - > 10% cellulose**
- **10g Ca et 6-7g P / kg brut**
- **Apports Oligo-éléments & vitamines**



Le sevrage se réalise progressivement sur une période de 2 semaines, en diminuant le volume de lait distribué (à concentration identique).

Veillez à garder des lots homogènes en taille, afin que les disparités entre animaux liées à la concurrence ne s'amplifient pas.

Enfin, tout au long de la vie du bovin, toujours garder des transitions alimentaires progressives entre 2 rations différentes.

Exemples d'aliments solides distribués en phase d'alimentation lactée :

- Aliment floconné 1^{er} âge du commerce
- Maïs grain seul jusqu'à 1 mois d'âge ; compléter avec une source de protéines et minéraux
- L'ensilage de maïs, ainsi que l'ensilage d'herbe, sont déconseillés jusqu'à 4 mois d'âge
- Mélange fermier = céréales broyées grossièrement – tourteau soja – CMV
- Aliment VL possible, mais riche en énergie, et appétent